

Les blessures au chien de chasse - Premiers soins

Par le Docteur vétérinaire Fabrice CAPBER - Propos recueillis par Bernard SCHEER

C'est une évidence, pas de recherche possible sans chien ! Notre compagnon est l'outil indispensable à l'exécution de notre mission. C'est lui qui sait, c'est lui qui nous emmène et c'est encore lui qui est le premier au contact de l'animal recherché. En première ligne, il prend tous les risques. Il arrive malheureusement qu'il le paye... Cet article présenté sous formes de fiches, permettra à chaque conducteur de lui apporter les premiers soins afin de le préserver.

État de choc

Symptômes: L'animal ne réagit plus. Son cœur bat et son pouls est faible. Les muqueuses (gencives, conjonctives) sont pâles voire blanches. La respiration peut être irrégulière, rapide ou lente. Les extrémités sont froides. La température corporelle peut être basse ou haute.

Conduite à tenir: L'état de choc peut faire suite à la quasi-totalité des pathologies décrites ci-dessous, la conduite à tenir doit donc prendre en compte la cause initiale.

Dans tous les cas: consulter rapidement un vétérinaire après avoir pratiqué les premiers soins d'urgence.

Hémorragie externe

Symptômes: Saignement abondant. Si hémorragie importante: muqueuses pâles, respiration et fréquence cardiaque accélérées, état de choc.

Conduite à tenir: Appliquer un pansement compressif. Maintenir le chien au chaud. En cas de saignement important, poser un garrot en amont de la plaie. Sur une artère, poser une pince à clamper.

Il s'agit d'une urgence véritable.

Fracture d'un membre

Symptômes: Le chien ne pose plus le membre atteint. Craquement et douleur vive à la manipulation. L'animal peut devenir très agressif ou au contraire être en état de choc.

Conduite à tenir:


1- fracture ouverte: Lavage à l'eau, couvrir la plaie d'un linge propre ou mieux avec des compresses stériles imbibées de Bétadine jaune.

2- fracture sous l'articulation du genou ou du coude: Immobiliser le membre à l'aide d'une attelle ou d'un gros pansement rembourré de coton.

3- fracture au-dessus de l'articulation du genou ou du coude: Coucher le chien du côté opposé et l'immobiliser.

Donner un antidouleur par la bouche si l'état de l'animal le permet.

Il s'agit d'une urgence relative en l'absence d'un état de choc.



Détresse respiratoire

Symptômes: Respiration accélérée, irrégulière, ouverture de la bouche, extension de la tête et du cou, coloration bleue des muqueuses, écartement des côtes, des coudes, état de choc.

Conduite à tenir: Libérer les voies respiratoires, ouvrir grand la bouche et tirer la langue pour être certain qu'aucun obstacle n'obstrue la gorge. Tenter une réanimation cardio-pulmonaire dans les cas extrêmes (bouche à nez, massage cardiaque).

En cas de noyade, sécher et réchauffer l'animal.

Il s'agit d'une urgence véritable.

Coup de chaleur

Symptômes: Température corporelle très élevée (41-42 °C). Halètements forts et irréguliers. Coloration bleue des muqueuses. Accélération du cœur. Salivation importante, vomissements. Tremblements ou convulsions pouvant évoluer en état de choc sévère voire en coma.

Conduite à tenir: Placer l'animal à l'ombre et au calme. Le rafraîchir avec de l'eau froide (serviette mouillée, immersion, aspersion).

Il s'agit d'une urgence véritable.

Plaies

Symptômes: Plaie superficielle ou plaie profonde, avec ou sans corps étranger (verre, saletés, plomb...). La plaie peut être simple, nette (coupure, morsure...) ou complexe (déchirure, écorchure...). Un saignement, voire une hémorragie peuvent accompagner la plaie.

Conduite à tenir: Lavage abondant à l'eau, tondre (si possible) ou couper les poils autour de la plaie aux ciseaux et désinfecter. Pour les plaies superficielles, laisser à l'air libre ou pansement léger. Pour les plaies profondes, pansement obligatoire en attendant de faire poser des points de suture dans les 6 heures maximum pour éviter l'infection.

Dans tous les cas, éviter le léchage de l'animal qui va aggraver et surinfecter sa blessure (utilisation d'un carcan ou d'un sur-pansement épais).

Il s'agit d'une urgence relative.

Morsure de serpent

Symptômes: L'inoculation du venin n'est pas systématique.

1- Morsure sans inoculation de venin: Trace des crochets (parfois morsures multiples), plaies non douloureuses, présence de sang, hématomes.

2- Morsure avec inoculation de venin: Plaies rouges, chaudes, douloureuses, hématomes, présence de sang et atteinte de l'état général: état de choc, détresse respiratoire, saignements spontanés par divers orifices (nez, vomissement, urine, selles).

Conduite à tenir: Lavage abondant à l'eau, tondre (si possible) ou couper les poils autour de la plaie aux ciseaux et désinfecter les plaies de morsure. Éviter la pose d'un garrot et d'aspirer le venin. Maintenir l'animal au calme. Gérer au mieux l'état de choc ou la détresse respiratoire le cas échéant.

Il s'agit d'une urgence véritable.

Envenimation par les crapauds

Symptômes: Inflammation de la bouche, de la langue. Douleur intense. Vomissements. Battements cardiaques plus lents, irréguliers. Détresse respiratoire. Convulsions et paralysie. Parfois douleur oculaire et yeux très rouges si projection de venin.

Conduite à tenir: Rinçage abondant de la gueule à l'eau ou des yeux au sérum physiologique.

Il s'agit d'une urgence véritable en raison du risque d'arrêt cardiaque.

Éventration

Symptômes: Les organes abdominaux sortent en raison d'une déchirure de la paroi musculaire soit sous la peau (on sent une masse flasque), soit à l'extérieur de l'animal si la peau est déchirée. L'animal est en état de choc, une hémorragie externe ou une rupture d'organes peuvent être associées à l'éventration.

Conduite à tenir: Rincer les viscères extériorisés. Envelopper le ventre et les viscères dans une serviette humide. Éviter l'automutilation à l'aide d'un carcan, d'une muselière ou d'une lacette.

Il s'agit d'une urgence véritable.

Tiques:

Symptômes: Le parasite est visible soit marchant sur les poils, soit déjà fixé. L'application d'un produit anti-tiques ou les vaccins contre les maladies à tiques ne garantissent pas qu'aucune tique ne se fixera.

Conduite à tenir: Les tiques sont actuellement considérées comme des vecteurs majeurs d'agents pathogènes (bactéries, virus ou protozoaires) chez le chien. L'étiquage manuel doit donc être réalisé le plus précocement possible à l'aide d'un crochet à tiques afin de retirer la tique vivante (il est contre-indiqué de l'endormir avant) et surtout de retirer sa tête.

La plaie de morsure doit être désinfectée.

Il ne s'agit pas d'une urgence mais d'un acte de prévention très important.

Les blessures au chien de chasse - Premiers soins (suite)

Traumatisme crânien

Symptômes : Diminution de la vigilance, apathie ou coma. Le corps est soit totalement rigide, soit rigide uniquement à l'avant et flasque à l'arrière. Les pupilles sont dilatées et il peut y avoir des écoulements auriculaires. Une fracture des os du crâne est possible. Si un traumatisme de la moelle épinière est associé, l'animal est paraplégique (pronostic plus sombre).

Conduite à tenir : Garder l'animal au calme et au chaud. Le transporter dans une couverture en le brusquant le moins possible.

Il s'agit d'une urgence véritable.

Accident de la circulation

Symptômes : L'animal est en général en état de choc et peut souffrir des différentes affections déjà décrites (fracture, hémorragie, détresse respiratoire...).

Conduite à tenir : Manipuler l'animal en douceur pour ne pas aggraver ses blessures et lui faire mal en le plaçant par exemple dans une couverture pour le déplacer. Faire attention aux morsures liées à la douleur. Le garder au chaud. Pratiquer les premiers soins d'urgence en fonction des symptômes observés.

Donner un antidouleur par la bouche si l'état de l'animal le permet.

Il s'agit d'une urgence véritable.



Trousse de secours :

Gants en latex
 Muselière ou lacette ou carcan
 Compresses stériles et non stériles
 Coton
 Elastoplast®, Vetrap® et bande de crêpe
 Bétadine jaune®, eau oxygénée...
 Pince, ciseaux, pince à clamer, crochet à tiques
 Couverture de survie
 Couverture pour couvrir ou brancarder l'animal
 Serviette
 Garrot
 Eau pour rincer les blessures, refroidir l'animal...
 Sérum physiologique pour rincer les yeux
 Anti-inflammatoire à prendre par la bouche
 Thermomètre (T normale = 38,5 °C)
 Lampe de poche
 Petite tondeuse rechargeable
 Sac-poubelle pour tous les déchets de soins